

UCB kondigt de afronding aan van de transcriptomics-/biomarkeranalyse van fase 2a van het onderzoek naar atopische dermatitis met galvokimig en de voltooiing van de inschrijving voor de fase 2b-studie.

- **Fase 2a transcriptomics/biomarkeranalyse toonde een aanzienlijke vermindering van belangrijke ontstekingsroutes** : een significant verminderde activiteit van ontregelde Th2-, Th17- en Th1-immuunroutes en genen van de huidbarrière in de aangedane huid werd waargenomen in week 12 met galvokimig.
- **Nieuw werkingsmechanisme** : galvokimig is een multispecifiek antilichaam dat is ontworpen om IL-13, IL-17A en IL-17F te remmen, waardoor twee verschillende, niet-redundante ontstekingsroutes (type 2 en type 3) worden geremd die belangrijk zijn voor chronische ontsteking bij atopische dermatitis (AD).
- **De Possibility [Fase 2b-studie](#) heeft de inschrijving afgerond** : een aparte studie naar de veiligheid en werkzaamheid van galvokimig bij matige tot ernstige Alzheimer is gaande, met de eerste resultaten die naar verwachting eind 2027 bekend zullen zijn.

Geachte journalist,

Ik ben blij nieuws te kunnen delen over UCB's galvokimig bij atopische dermatitis:

Fase 2a transcriptomics/biomarkeranalyse toonde een aanzienlijke vermindering van belangrijke ontstekingsroutes aan.

Uit de resultaten van het onderzoek, gepresenteerd op het congres van de European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) in Wenen, Oostenrijk (30 september – 3 oktober), bleek het volgende: ¹

- Bij aanvang vertoonde het bioptweefsel van de laesies bij AD-patiënten een ontregeling van belangrijke ontstekingsroutes, waaronder Th1, Th2 en Th17.
- Behandeling met galvokimig in week 12 ging gepaard met een aanzienlijke verlaging van de genexpressie van *IL-13*, *IL-17A* en *IL-17F*.
- Het resulteerde ook in een verzwakking van belangrijke ontstekingsroutes, waaronder de Th2-, Th17- en Th1-immuunroutes en de bijbehorende genen die betrokken zijn bij de pathogenese van de ziekte van Alzheimer, zoals *IL-31* en *IL-19*.
- Belangrijke genen die geassocieerd zijn met epidermale ontsteking/hyperproliferatie (*KRT6A* en *KRT16*) werden omlaag gereguleerd en er werd een verhoogde expressie van genen die de integriteit van de huidbarrière bevorderen (*FLG* en *LORICRIN*) waargenomen na behandeling met galvokimig.

- Deze gegevens, in navolging van de positieve werkzaamheidsgegevens die op EADV 2025 werden gepresenteerd, ondersteunen het therapeutische potentieel van gelijktijdige remming van IL-13, IL-17A en IL-17F bij AD.

"De transcriptomische en biomarkeranalyse van galvokimig bij atopische dermatitis, gepresenteerd op EADV, levert een belangrijke bijdrage aan ons begrip van de pathofysiologie die ten grondslag ligt aan deze chronische ontstekingsaandoening. Daarnaast ondersteunt de analyse het therapeutische potentieel van het gelijktijdig aanpakken van IL-13, IL-17A en IL-17F met deze therapie," aldus Dr. Raj Chovatiya, MD, PhD, MSCI, universitair hoofddocent aan de Rosalind Franklin University Chicago Medical School en oprichter en directeur van het Center for Medical Dermatology and Immunology Research in Chicago. "Dit is een veelbelovende nieuwe onderzoeksrichting en ik kijk uit naar meer studies die de potentiële cellulaire en moleculaire impact van galvokimig bij atopische dermatitis onderzoeken."

Over galvokimig en de aanwezigheid van UCB op EADV

De mechanistische samenvatting van UCB over galvokimig zal als poster worden gepresenteerd op het jaarlijkse EADV-congres van 2026. De samenvatting vormt een aanvulling op de 22 andere presentaties van UCB over hidradenitis suppurativa, psoriasis, psoriatische artritis en axiale spondyloartritis – en onderstreept de inzet van UCB om de resultaten voor mensen met immuungemedieerde ontstekingsziekten te verbeteren.

"Atopische dermatitis treft miljoenen mensen wereldwijd en kan een grote impact hebben op het dagelijks leven van patiënten en hun families, vooral omdat veel patiënten slechts beperkt reageren op bestaande behandelingen", aldus Dr. Chris McCabe, PhD, Global Asset Medical Community Head bij UCB. "Naast onze overtuigende proof-of-concept-werkzaamheidsgegevens die we presenteerden op EADV 2025, bieden deze mechanistische gegevens verdere ondersteuning voor het therapeutische potentieel van galvokimig bij deze chronische ontstekingsaandoening."

Galvokimig wordt momenteel klinisch onderzocht voor de behandeling van atopische dermatitis, chronische obstructieve longziekte (COPD) en niet-cystische fibrose bronchiectasie (NCFB). Galvokimig is wereldwijd door geen enkele regelgevende instantie goedgekeurd.

Het abstract over galvokimig op EADV 2026:

Referentie:

1. Chovatiya R, et al. Galvokimig, een multispecifieke, op antilichamen gebaseerde IL-13-, IL-17A- en IL-17F-remmer, moduleert het transcriptoom van laesies en circulerende biomarkers bij atopische dermatitis: bevindingen uit een 12 weken durende fase 2a-studie. EADV 2026. AS-754.

Grafiek 1 Galvo
EADV
Mediawaarschuwing

Als u in de toekomst geen berichten meer van UCB SA wilt ontvangen, kunt u ons dat laten weten door [hier te klikken](#).
UCB SA, [Allé en la Recherche, 60., Brussel, . B - 1070 België](#)

